

# 関市 定期予防接種のご案内

令和4年4月1日現在

定期の予防接種は法律に基づくものです。対象となる年齢の方は、標準的な接種時期に予防接種を受けましょう。

予防接種名	対象年齢	標準的な接種時期	接種間隔・回数	
ロタウイルス	ロタリックス 出生6週0日後から24週0日後までの間にあるもの ロタテック 出生6週0日後から32週0日後までの間にあるもの	初回接種については、 生後2月に至った日から 出生14週6日後までの間	<ロタリックス> 27日間隔で2回 <ロタテック> 27日間隔で3回	
B型肝炎	生後1歳未満 ※ただし平成28年4月1日以降に生まれたもの	生後2カ月～9カ月未満	27日(4週)以上の間隔で2回接種。 第1回目の注射から139日(20週)以上あけて第3回目接種。	
ヒブ感染症	生後2カ月～5歳未満	<初回接種開始時期> 生後2カ月～7カ月未満 <追加接種> 初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく	<標準的な接種パターン> 27～56日(4～8週)の間隔で初回3回接種。 初回3回目接種から7～13カ月までの間隔をおいて追加接種1回 ※初回接種3回は、1歳までに終了すること。 <標準的な接種パターン以外> ・接種開始が生後7カ月～1歳未満の場合 初回2回、追加1回を接種 ※初回2回は、1歳までに終了すること。 ・接種開始が1歳～5歳未満の場合 1回接種	
小児用肺炎球菌感染症	生後2カ月～5歳未満	<初回接種開始時期> 生後2カ月～7カ月未満 <追加接種> 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後15月未満	<標準的な接種パターン> 1歳までに27日(4週)以上の間隔をおいて初回3回接種。 初回3回目接種終了後60日以上の間隔をおいて、1歳以降に追加接種1回 ※初回2回目は1歳までに、初回3回目は2歳までに終了すること <標準的な接種パターン以外> ・接種開始が生後7カ月～1歳未満の場合 生後13カ月までに初回2回、追加1回を接種 ※初回2回は、2歳までに終了すること ・接種開始が1～2歳未満の場合 2回接種 ・接種開始が2～5歳未満の場合 1回接種	
BCG	1歳未満	生後5カ月～8カ月未満	1回	
ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ (四種混合)	1期	～7歳6カ月未満	【1期初回】 生後3カ月～1歳未満 【1期追加】 1期初回3回目の接種終了後、1年～1年半未満に接種	【1期初回】 20～56日(3～8週)の間隔をおいて初回3回接種 【1期追加】 1期初回3回目の接種終了後、1年～1年半未満に接種
	2期	11歳～13歳未満	11歳～12歳未満	ジフテリア破傷風混合ワクチンを1回接種
麻しん風しん 混合	1期	1歳～2歳未満	対象年齢になったら早めに接種	1回
	2期	5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間(年長児)		1回
水痘(水ぼうそう)	1歳～3歳未満	【1回目】 1歳～1歳3カ月未満 【2回目】 1回目から6～12カ月の間隔をおく	3カ月以上の間隔をおいて2回接種	
日本脳炎	1期	生後6カ月～7歳6カ月未満	【1期初回】 3歳～4歳未満 【1期追加】 4歳～5歳未満	【1期初回】 6～28日(1～4週)までの間隔をおいて2回接種 【1期追加】 1期初回2回目の接種終了後、おおむね1年あけて1回接種
	2期	9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	1回
	特例対象者	平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれたもの	1期、2期未接種回数分	詳細は、保健センターにお尋ねください。
子宮頸がん	小学校6年生～ 高校1年生相当の女子	中学1年生の間	<サーバリックス> 初回接種から1カ月後に1回、 初回から6カ月後に1回接種(計3回) <ガーダシル> 初回接種から2カ月後に1回、 初回から6カ月後に1回接種(計3回)	

※接種間隔等の詳細は、「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。

※上記の接種間隔で接種ができなかった場合は、保健センターまたは関市指定医療機関に接種スケジュールをお尋ねください。